

初列風切の換羽時期(緑がP1の脱落からP10の完了を示します)

種, 亜種	和名	1月	2月	3月	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月
Larus crassirostris	ウミネコ	P1:6月下旬, P3-4:6月下旬/8月上旬, P4-7:8月下旬, P7-9:9月中下旬, P10:10月中旬-11月中旬											
Larus canus canus	カモメ	P1:6月中旬, 30-50%P1-3:6月中下旬, P4-5:8月上旬, P6-8:8月下旬, P9-10:9月-10月中旬											
Larus f. graellsii	ニシヒメセグロカモメ	南部では初列風切の換羽は5月-8月上旬に始まる。ノルウェー, デンマーク, 西ヨーロッパでは5月下旬-6月中旬に始まり, P2-4:7月, P3-6:8月下旬-9月上旬, P7-9:10月中下旬, P10:(10月中旬)11月上旬-12月(1月上旬)											
Larus f. intermedius	タイリクヒメセグロカモメ	南部では初列風切の換羽は5月-8月上旬に始まる。ノルウェー, デンマーク, 西ヨーロッパでは5月下旬-6月中旬に始まり, P2-4:7月, P3-6:8月下旬-9月上旬, P7-9:10月中下旬, P10:(10月中旬)11月上旬-12月(1月上旬)											
Larus f. fuscus	バルトカモメ	P1-2(4):7月中旬-8月, 移動前から移動中は換羽を中止する。P1-2(4):7月-9月, P4(再開):10月-11月, P8-9:1月-2月, P9-10:3月上旬(少数が4月中旬移動期間に換羽する)											
Larus f. heuglini	ホイグリンカモメ	P1-4:6月中旬-8月中旬(2-5%が6月中旬までにP1を換羽する), P4:9月上旬, P5-7:11月, ごく少数(繁殖に失敗した個体?)が11月中旬までに換羽が完了する。オマーンではP4-8:11月上中旬, P9-10:1月-3月上旬(4月)。次列風切は4月までに完了しないものもある。尾は11月に大量に換羽する。											
Larus f. barabensis	ステップカモメ	P1:5月下旬, P4-6:9月, P7-9:11月, 換羽の完了は(10月中旬)12月中旬-1月(1-2%2月中旬)。移動期間中は換羽を中止する。											
Larus argentatus	ヨーロッパセグロカモメ	P1:5月中旬-7月上旬, デンマーク東部ではP1は5月中下旬に脱落する。P3-5:7月下旬, P5-6:8月中旬, P(5)6-8(10):9月下旬, P8-9:10月中旬, P10:10-20%10月下旬, 50%12月上旬, 90%12月下旬。繁殖地が北側(スカンジナビア半島の北部)のものは1月下旬でも換羽が完了しない。また、西部(デンマーク西部を含む)のものは一般的に換羽時期が早くP9-10は9月中旬/10月中旬-11月下旬に換羽が完了する。											
Larus a. argenteus	ニシヨーロッパセグロカモメ	P1:4月下旬-5月, P3-5:7月上旬, P7-8:9月下旬-10月中旬, P9-10:10月下旬-11月上旬											
Larus cachinnans	カスピカモメ	P1:4月上旬, P6-8(9):8月中下旬, P9-10:9月中旬-10月上旬(アラブ首長国連邦では11月中旬-12月上旬との報告がある。Garner 1997)											
Larus s. vegae	セグロカモメ	P1-2:7月上旬, P3-5:8月, P5-6(9):9月中旬-10月, P7-8:11月下旬, P9-10:12月下旬-2月, 多くは1月上旬に換羽を完了する。											
Larus s. mongolicus	モンゴルカモメ	P2-3:11月上旬, P4:11月中旬, P5:11月下旬, P6-7:12月中下旬, P8:1月上旬, P9:2月上旬, P10:2月中旬-3月下旬(千々石海岸での観察による)											
Larus s. smithsonianus	アメリカセグロカモメ	P1:5月下旬, P1-2:6月上旬(ブリティッシュコロンビア), P3-5:7月下旬, P5-6:8月中旬, 東海岸ではP(5)7-9(10):9月下旬-10月中旬, 西海岸では遅く(カリフォルニア)P6-8:9月中下旬, P8-10:11月上旬, 12月下旬の1羽の記録がある。											
Larus schistisagus	オオセグロカモメ	5月から冬羽への換羽が始まり7月までにP4が新しくなる。P5-7:8月下旬, P9-10(9月下旬)10-11月											
Larus glaucus	ワシカモメ	P1:5/6月下旬, P4-6:7月, P5-7:8月, P7-9:9月中下旬, P10:10月-11月											
Larus hyperboreus	シロカモメ	P1:(4月下旬)7月上旬, ほとんどがP3-6は7月中旬-8月中旬, P5-8:8月下旬-9月上旬, P9-10:(9月下旬)10月下旬-11月。めったに無いがまれに2月まで掛かるものもある。											
Larus marinus	オオカモメ	P1:5月中旬-6月中旬(アイスランド)6月下旬-7月上旬(スカンジナビア, 西ヨーロッパ), 6月までにアイスランドで繁殖するものはP4-5まで, スカンジナビアのものはP2-4まで到達する。スカンジナビア南部のものはP3-5:8月, P6-8:9月-10月上旬, P9-10:(10月下旬)11月中旬-12月下旬											

参考文献:Klaus Malling Olsen K.M. & Larsson H. (2004) <D>GULLS OF EUROPE, ASIA AND NORTH AMERICA</D>. CHRISTOPHER HELM, LONDON
モンゴルカモメは千々石海岸での実測値